

SKILLSTATION 14 – Lavt blodsukker/diabetes

- MÅL:** Førstehjælperen skal yde førstehjælp til en person med for lavt blodsukker.
- VILKÅR:** Førstehjælperen har til sin rådighed én figurant, samt personens insulinpen (attrap, der kan simulere insulinpen – den behøver ikke at være en tro kopi, men prøv at nærme det så meget som muligt)
Herudover skal der være noget sødt at drikke/spise til rådighed!
- TILFREDSHEDS-INDIKATOR:** Førstehjælperen skal opnå 4 ud af 5 rigtige handlinger på kontrolskemaet
- INSTRUKTION:** Du finder en person, der er yderst svimmel, bleg og koldsvedende. Herudover fornemmer du en lettere aggressiv adfærd, når du taler med vedkommende. Personen har netop injiceret insulin i sig selv.
- BEMÆRKNING:**

HANDLING	RIGTIG
Skabes der sikkerhed/ro omkring personen?	JA / NEJ
Gives der noget sødt at drikke eller spise?	JA / NEJ
Ydes der psykisk førstehjælp under hele forløbet?	JA / NEJ
Spørges der ind til sygehistorien (er personen kendt med diabetes?)	JA / NEJ
Opfordres der til at der gives brød eller lignende (efter sukkerbehandlingen) pga. den gode langtidseffekt af dette?	JA / NEJ
Vigtigt: Da der her er tale om insulinshock, må der <u>ikke</u> gives insulin, da blodsukkeret er kritisk lavt (se Førstehjælpens ABC, s. 130)	OBS
Hvis personen ikke har alle handlinger rigtige skal prøven gennemføres igen	